

## SUFLAVE PREPARACIÓN

**Por favor, lea todas las instrucciones siguientes para su preparación del colon por lo menos 1 semana antes de su procedimiento.**

**Si tiene alguna pregunta sobre la preparación intestinal, la hora de su procedimiento o problemas durante la preparación intestinal, comuníquese con la enfermera del hospital o centro de endoscopia donde se realizará su procedimiento. El número de teléfono de su instalación se encuentra en la última página de estas instrucciones para su conveniencia.**

### **ANTICOAGULANTES:**

Si está tomando anticoagulantes, debe notificar a su doctor de nuestras recomendaciones de no tomar cualquier anticoagulante antes de la colonoscopia.

### **COMPRE EN LA FARMACIA/TIENDA:**

1. Preparación Suflave (**prescripción**)
2. Cuatro masticables o cápsulas de Simeticona/Anti-Gas (Gas-X) (**sin receta**)

### **EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

1. Sólo puede consumir **líquidos claros** en este día. Los líquidos claros consisten en agua, jugos sin pulpa, Gatorade/Powerade, té, café negro, caldo o bouillon, gelatina, o paletas de hielo. **NO consuma comida sólida**, productos lácteos o alcohol este día. **NO** tome ningún líquido con colorante rojo, azul o morado.
2. Sugerimos mezclar previamente las dos botellas por la mañana y refrigerarlas para un mejor sabor. No congele. Para hacerlo, tome 1 paquete de sabor con 1 botella y llene la botella proporcionada con agua tibia hasta la marca de llenado. Cierre el frasco y agítelo, suavemente para mezclar (disolver) todo el polvo y colóquelo en el refrigerado (harás esto con las dos botellas).
3. A las **5pm** beba 8 onzas de la primera botella cada 15 minutos hasta que el frasco este vacío.
4. Durante las próximas 4 horas, beba cinco vasos de 8 onzas de agua o un líquido claro.
5. A las **7pm** tome 2 masticables de simeticona/antigás.
6. A las **8pm** tome 2 masticables de simeticona/antigás adicionales.
7. Continúe tomar agua o un líquido claro hasta la media noche si lo desea.

### **LA MAÑANA DEL PROCEDIMIENTO:**

1. **Cinco horas** antes de llegar al procedimiento, tome la segunda botella de Suflave (ya debería estar mezclado). Beba 8 onzas de la solución cada 15 minutos hasta que el frasco este vacío. Esto debe hacerse dentro de dos horas y luego debe suspender todos los líquidos por completo.
2. **Deben de dejar de tomar todos los líquidos claros 2 horas antes de la cita, esto incluye chicle y mentas.**

## **Endoscopy Facilities**

### **Central Utah Surgical Center**

(801) 374-0354  
1067 North 500 West Suite 100 Building B  
Provo, UT 84604

### **Timpview Surgical Center**

(801) 492-5994  
1175 East 50 South Suite 101  
American Fork, UT 84003

### **American Fork Hospital Endoscopy Department**

(801) 855-3361  
170 North 1100 East  
American Fork, UT 84003

### **Spanish Fork Hospital Endoscopy Department**

(385) 344-6011  
765 East Market Place Drive  
Spanish Fork, UT 84660

### **Utah Valley Hospital Endoscopy Department**

(801) 357-7743  
1034 North 500 West  
Provo, UT 84604

### **Mountain View Hospital Same Day Surgery**

(801) 465-7576  
1000 East 100 North  
Payson, UT 84651

### **Timpanogos Hospital Same Day Surgery**

(801) 714-6644  
750 West 800 North  
Orem, UT 84057